

NORMATIVA

Fonte: EMA

Vaccino chikungunya poteva causare meningite anche nei giovani sani

Pubblicato il 2026-03-25

L'Agenzia europea del farmaco ha aggiornato le informazioni sul vaccino Ixchiq contro la chikungunya. Il rischio di meningite asettica poteva colpire anche giovani adulti sani, non solo anziani.

L'Agenzia europea del farmaco (EMA) ha completato la revisione di un caso di meningite asettica collegato al vaccino Ixchiq contro la chikungunya. Il caso ha riguardato un giovane adulto sano che ha sviluppato questa infiammazione delle membrane che circondano cervello e midollo spinale dopo la vaccinazione. La meningite asettica è causata da virus, non da batteri. Questo effetto collaterale era già noto e riportato nelle informazioni del vaccino, insieme ad altri disturbi del sistema nervoso come encefalopatia ed encefalite. Quello che cambia ora è che questi effetti gravi sono stati osservati anche in giovani adulti sani. Prima, la maggior parte dei casi segnalati aveva riguardato persone over 65 o con più malattie croniche. I sintomi da tenere sotto controllo includono confusione, sonnolenza, febbre, mal di testa, convulsioni e rigidità del collo. Chi sviluppa questi sintomi dopo il vaccino deve rivolgersi subito a un medico. L'EMA sta anche conducendo una valutazione completa del vaccino che si concluderà a giugno 2026. Questo permetterà di verificare se le nuove informazioni sui rischi cambiano il rapporto tra benefici e rischi del vaccino. Come per tutti i medicinali, la sicurezza del vaccino Ixchiq viene monitorata costantemente e le raccomandazioni per l'uso vengono aggiornate quando emergono nuove informazioni rilevanti.

COME TI RIGUARDA

Se stai pianificando un viaggio in zone dove è presente la chikungunya (principalmente Africa, Asia e alcune aree tropicali delle Americhe), potresti aver considerato questo vaccino. Ora sai che il rischio di meningite asettica esiste anche per i giovani adulti sani, non solo per gli anziani. Se hai già ricevuto il vaccino Ixchiq, controlla se sviluppi sintomi come mal di testa forte, febbre, confusione o rigidità del collo nei giorni seguenti. In caso di questi sintomi, rivolgiti subito al pronto soccorso specificando di aver ricevuto il vaccino. Se devi ancora decidere se vaccinarti, parla con il tuo medico per valutare i rischi del viaggio rispetto ai possibili effetti collaterali del vaccino.

DATI DELL'ATTO

Data: 13/03/2026

Fonte ufficiale:

<https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-9-12-march-2026>

